

Alteplas - Trombosbehandling vid Rädda Hjärnan

Författat: Erica Nygren

Slutgranskat: Johnny Heikkilä

Beslutat: Stina Gerdevåg

Generiskt namn Alteplas

Alternativt preparatnamn Actilyse

Blanda Alteplas med medföljande lösning till 1 mg/ml.

Bolusinjektion: Administrera 10% av beräknad dos under 1-2 minuter som en intravenös injektion.

Använd 10 ml spruta.

Infusion: Administrera resterande mängd som infusion under 1 timme. Använd sprutpump. När den ordinerade mängden tillförts avslutas infusionen med en liten mängd NaCl. Detta för att säkerställa att patienten får ordinerad mängd.

Dosen skall vara 0,9 mg/kg kroppsvikt, dock maximalt 90 mg.

Vikt (kg)	Total dos tPA (1 mg/ml) i ml	Bolusdos (=10%) i ml	Infusionstakt (ml/timme)	Antal förpackningar:		
				på 50 mg	på 20 mg	på 10 mg
40	36	4	32	1		
42	38	4	34	1		
44	40	4	36	1		
46	41	4	37	1		
48	43	4	39	1		
50	45	5	40	1		
52	47	5	42	1		
54	49	5	44	1		
56	50	5	45	1		
58	52	5	47	1		1
60	54	5	49	1		1
62	56	6	50	1		1
64	58	6	52	1		1
66	59	6	53	1		1
68	61	6	55	1	1	
70	63	6	57	1	1	
72	65	7	58	1	1	
74	67	7	60	1	1	
76	68	7	61	1	1	
78	70	7	63	1	1	
80	72	7	65	1	1	1
82	74	7	67	1	1	1
84	76	8	68	1	1	1
86	77	8	69	1	1	1
88	79	8	71	1	1	1
90	81	8	73	1	2	
92	83	8	75	1	2	
94	85	9	76	1	2	
96	86	9	77	1	2	
98	88	9	79	1	2	
>100	90	9	81	1	2	

Doseringschema taget ifrån dokument Rädda Hjärnan, RÖL. (Dok.nr 320288).