

Labetalol-Användning och dosering - AnIVA

Författat av: S Persson/J Granberg

Generiskt namn: Labetalol

Alternativa preparatnamn: Trandate

Gäller för:

Vuxna

Spädning Alt. 1 Labetalol 5 mg/ml, 10 ml tillsätts i 40 ml Glucos 50 mg/ml vilket ger en **koncentration på 1 mg/ml. Totalvolym = 50 ml.**

(Infusionspump) Alt. 2 Labetalol 5 mg/ml, 100 ml blandas i 400 ml Glucos 50 mg/ml, vilket ger en **koncentration på 1 mg/ml. Totalvolym = 500 ml.**

Alt. 3 Kan även ges outspädd med **koncentration 5 mg/ml**

Dosering Inled med bolusinjektion 5-10 mg i.v vilket kan upprepas. Vid behov fortsättes med infusion 1-2 mg/min.

Max.dosen 200 mg/dygn bör ej överskridas.

Indikationer Behandling av svår hypertoni, inklusive svår graviditetsrelaterad hypertoni.

Postoperativ hypertension med takykardi.

Egenskaper Labetalol sänker det perifera kärlmotståndet genom perifer α -receptorblockad. Den ger också oselektiv β -receptorblockad, vilket sänker hjärtfrekvensen.

Biverkningar Hypotension, bradykardi.

Alt. 1. Ges via läkemedelsprotokoll **Labetalol 1 mg/ml**, Alaris **CC**

Alt. 2. Ges via läkemedelsprotokoll **Labetalol 1 mg/ml**, Alaris **VP**

Alt. 3. Ges via läkemedelsprotokoll **Labetalol 5 mg/ml**, Alaris **CC**