

Lumbalpunktion vid misstänkt CNS-infektion

Upprättat av: Sara Tell & Niklas Sjödahl

Labanalyser vid misstanke om CNS-infektion:

Remiss: RoS (analysgrupp "LP-inf") Observera att P-Glukos ingår i provtagningen.
Säkerställ alltid med ansvarig läkare angående eventuella ytterligare analyser

RÖR 1: Liqvor för direktmikroskopi och odling.

Volym: 2 ml.

Remiss: Läkare skriver mikrobiologi-remiss i RoS

RÖR 2: Csv-Akut Infektion PCR.

Volym: 2 ml.

RÖR 3: FrysCsv

Volym: 2-5 ml

RÖR 4: Csvcell, Glu-Csv, Albumin-Csv

Volym: 2 ml, notera provtagningstid på remissetiketten

RÖR 5: LaktatCsv

Volym: 2 ml, notera provtagningstid på remissetiketten

Checklista Lumbalpunktion vid misstänkt CNS-infektion

- Mikrobiologiremiss skrivs av ansvarig läkare i RoS
- Beställ analyser i RoS – använd analysgruppen "LP-Inf". Observera att venprov P-Glukos ingår. Ta blodprov före eller efter lumbalpunktionen.
- Säkerställ att allt material enligt materiallista finns tillgängligt.
- Säkerställ att provrören är numrerade 1 till 5.
- Skicka rör 2-5 till Kemlab inom 30 minuter oavsett tid på dygnet med transportör. **Ej rörpost.**
- Skicka rör 1 till Mikrobiologen. Under kväll/natt förvara provet i akutens kylskåp, skicka röret med transportör till Mikrobiologen på morgonen.