

Lumbalpunktion vid misstänkt SAB

Upprättat av: Sara Tell & Niklas Sjö Dahl

Labanalyser vid misstanke om subaraknoidalblödning:

Remiss: RoS (analysgrupp ”LP-SAB”). Observera att S-Protein och S-Bilirubin ingår i provtagningen.
Säkerställ alltid med ansvarig läkare angående eventuella ytterligare analyser.

RÖR 1: Slask

Volym: 2 ml

Avstämning med läkare

RÖR 2: FrysCsv

Volym: 2 ml

RÖR 3: Abskurva

Volym: 2 ml

OBS! Röret skall omgående packas in i aluminiumfolie för ljusskydd.

RÖR 4: Csvcell, Albumin-Csv

Volym: 2 ml

Notera: Vid sparsamt utbyte vid LP går det bra att skicka även rör 1 eller 2 för analys.

Checklista Lumbalpunktion vid misstänkt subaraknoidalblödning

- Säkerställ att material enligt materiallista finns tillgängligt
- Säkerställ att provrören är numrerade 1 till 4.
- Beställ analyser i RoS – använd analysgruppen ”LP-SAB”. Observera att venprov S-Protein och S-Bilirubin ingår.
- Ta blodprov för S-Protein och S-Bilirubin före eller efter lumbalpunktionen.
- Efter LP – packa in rör 3 i aluminiumfolie för ljusskydd.
- Skicka det inpackade röret till Kemlab inom 30 minuter oavsett tid på dygnet med transportör. Ej rörpost.



- Stäm av med ansvarig läkare vad som skall göras med rör 1