



# DOSERINGSSCHEMA AKUTA TILLSTÅND VUXEN

## ALLERGISK CHOCK, ANAFYLAXI

<b>Adrenalinpenna (vuxen)</b>	0,3 mg/penna 2 styck	0,3 mg ges i.m. i låret. Kan upprepas.
-------------------------------	-------------------------	----------------------------------------

<b>Ringer-Acetat</b>	1000 ml 1 påse	500 - 1000 ml ges under 30 minuter i.v.
----------------------	-------------------	-----------------------------------------

<b>Betapred</b>	4 mg/ml 5 x 1 ml	8 mg (2 ml) ges i.v.
-----------------	---------------------	----------------------

## BRADYKARDI

<b>Atropin</b>	0,5 mg/ml 2 x 1 ml	0,5 mg (1 ml) ges i.v. Kan upprepas.
----------------	-----------------------	--------------------------------------

## HYPOGLYKEMI

<b>Glukos</b>	300 mg/ml 6 x 10 ml	30 ml eller mer i.v. tills medvetslös patient vaknar.
---------------	------------------------	-------------------------------------------------------

## KRAMPANFALL

<b>Diazepam</b>	5 mg/ml 2 x 2 ml	10-20 mg (2-4 ml) ges i.v. eller rektalt.
-----------------	---------------------	-------------------------------------------

Akutläkemedel och detta PM ska förvaras på akutvagnen.

Efter användning skall akutläkemedel omedelbart återställas. Kontroll minst en gång per vecka.

Lokal verksamhetschef kan besluta om tillägg av läkemedel.

# DOSERINGSSCHEMA

## AKUTA TILLSTÅND BARN

### ALLERGISK CHOCK, ANAFYLAXI

1) **Adrenalin intramuskulärt**, kan upprepas, 2 pennor av vardera ska finnas.

<b>Små barn under 20 kg</b> Adrenalinpenna 0,15 mg ges i.m. i låret	<b>Stora barn över 20 kg</b> Adrenalinpenna 0,30 mg ges i.m. i låret
------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------

2) **Ringer-Acetat** 20ml/kg ges snabbt i.v. eller intraosseöst, kan upprepas.

<b>5 kg</b> 100 ml	<b>10 kg</b> 200 ml	<b>20 kg</b> 400 ml	<b>30 kg</b> 600 ml	<b>40 kg</b> 800 ml
-----------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

3) **Betapred 4 mg/ml** ges i.v. eller i.m.

<b>Små barn under 20 kg</b> 1 ml (4 mg) i.v.	<b>Stora barn över 20 kg</b> 2 ml (8 mg) i.v.
-------------------------------------------------	--------------------------------------------------

### HYPOGLYKEMI

**Glucos 300 mg/ml** ges 1,5 ml/kg i.v. eller intraosseöst.

<b>5 kg</b> 7,5 ml	<b>10 kg</b> 15 ml	<b>20 kg</b> 30 ml	<b>30 kg</b> 45 ml	<b>40 kg</b> 60 ml
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

### HYPOVOLEMI

**Ringer-Acetat** 20 ml/kg ges snabbt i.v. eller intraosseöst, kan upprepas.

<b>5 kg</b> 100 ml	<b>10 kg</b> 200 ml	<b>20 kg</b> 400 ml	<b>30 kg</b> 600 ml	<b>40 kg</b> 800 ml
-----------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

### KRAMPANFALL

**Diazepam 5 mg/ml** ges 0,5 mg/kg i.v. eller rektalt.

<b>5 kg</b> 0,5 ml	<b>10 kg</b> 1 ml	<b>20 kg</b> 2 ml	<b>30 kg</b> 3 ml	<b>40 kg</b> 4 ml
-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------